

Ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) apmoka kai kuriuos nuo užkrečiamųjų ligų apsaugančius skiepus, skirtus vaikams ir suaugusiesiems. Vaikų profilaktinių skiepų kalendorius:



LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ KALENDORIUS

* Parengta pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-08-29 įsakymo Nr. V-955 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepimų kalendoriaus patvirtinimo“ 2023-02-01 redakciją.

Eil. Nr.	VAKCINA	AMŽIUS													
		Iki 24 val.	2-3 paros	1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	12-15 mėn.	15-16 mėn.	18 mėn.	6-7 metai	11 metų	15-16 metų
1.	Tuberkuliozės vakcina		BCG												
2.	Hepatito B vakcina	HepB*		HepB					HepB						
3.	Kokliušo, difterijos, stabligės vakcina				DTaP		DTaP		DTaP			DTaP	DTaP		DTaP
4.	B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcijos vakcina				Hib		Hib		Hib			Hib			
5.	Poliomielito vakcina				IPV		IPV		IPV			IPV	IPV		
6.	Pneumokokinės infekcijos vakcina				PCV		PCV			PCV**					
7.	Tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina										MMR**		MMR		
8.	Žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina													HPV1 HPV2***	
9.	B tipo meningokokinės infekcijos vakcina					MenB		MenB		MenB**					
10.	Rotavirusinės infekcijos vakcina				RV		RV		RV****						

Sutrumpinimai:

BCG – tuberkuliozės vakcina;
HepB – hepatito B vakcina;
DTaP – kokliušo (nelgstelinio), difterijos, stabligės vakcina;
Hib – B tipo *Haemophilus influenzae* infekcijos vakcina;
DTaP – kokliušo (nelgstelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina;
IPV – inaktyvuota poliomieliito vakcina;
PCV – pneumokokinės infekcijos (polisacharidinė konjuguota) vakcina;
MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina;
HPV – žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina;
RV – rotavirusinės infekcijos vakcina;
MenB – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina.
HepB* pirmą dozę turi būti skiepijama naujagimiui per 24 val. po gimimo.
PCV** ir MenB** gali būti skiepijama kartu (vieno vizito metu) su MMR** vakcina.
HPV*** skiepimo schemą sudaro dvi HPV dozės (tarp pirmos ir antros HPV dozės turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn. laikotarpis).
Visi vaikai nemokamai skiepiami dviem vakcinų dozėmis. Taikant kitą skiepimo schemą, kai reikalingos daugiau nei dvi vakcinų dozės, du skiepėjimai atliekami nemokamai, kiti skiepėjimai atliekami savo lėšomis. Skiepėjimai, atlikti savo lėšomis, nekompensuojami.
RV**** trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penikvivalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje.

* Leidimą rėmė Pasaulio sveikatos organizacijos biuras Lietuvoje.



Sutrumpinimai: BCG – tuberkuliozės vakcina; HepB – hepatito B vakcina; DTaP – kokliušo (*neląstelinio*), difterijos, stabligės vakcina; Hib – B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (*neląstelinio*), difterijos, stabligės (*suaugusiųjų*) vakcina; IPV – inaktyvuota poliomielito vakcina; PCV – pneumokokinės infekcijos (*polisacharidinė konjuguota*) vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; MenB – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina.

- HepB pirma dozė turi būti įskiepijama naujagimiui per 24 val. po gimimo.
- PCV ir MenB gali būti skiepijama kartu (*vieno vizito metu*) su MMR vakcina.
- HPV skiepijimo schemą sudaro dvi HPV dozės (*tarp pirmos ir antros HPV dozių turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn. laikotarpis*). Visi vaikai nemokamai skiepijami dviem vakcinų dozėmis. Taikant kitą skiepijimo schemą, kai reikalingos daugiau nei dvi vakcinų dozės, du skiepijimai atliekami nemokamai, kiti skiepijimai atliekami savo lėšomis. Skiepijimai, atlikti savo lėšomis, nekompensuojami.
- RV trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje.
- Skiepijimai atliekami pagal vaistinio preparato charakteristikų santrauką.
- Prieš kiekvieną vaiko skiepijimą tėvus ar teisėtus globėjus būtina informuoti apie vakcinų skyrimą, galimas nepageidaujamas reakcijas į skiepą. Dėl informacijos gavimo bei sutikimo skiepyti jie turi pasirašyti Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje.
- Jei vaikas laiku nepaskiepijamas, jam sudaromas individualus skiepijimų kalendorius pagal indikacijas, nurodytas vaistinių preparatų charakteristikų santraukose.

Skiepo pavadinimas
Pneumokokinė polisacharidinė konjuguota vakcina „Prevenar“ (<i>reikalinga 1 dozė</i>)
Vėjaraupių vakcina „Varivax“ (<i>reikalingos 2 dozės</i>)
B grupės meningokokų vakcina „Bexsero“ (<i>reikalingos 2 arba 3 dozės, priklausomai nuo amžiaus</i>)
Hepatito B suaugusiems vakcina „Engerix- B“ (<i>reikalingos 3 dozės</i>)
Erkinio encefalito vakcina (<i>suaugusiems</i>) „TicoVac 0,5ml.“ N1 (<i>reikalingos 3 dozės + palaikomoji</i>)
Erkinio encefalito vakcina (<i>vaikams</i>) „TicoVac 0,25ml.“ N1 (<i>reikalingos 3 dozės + palaikomoji</i>)
Žmogaus papilomos viruso vakcina Gardasil 9